

水禽雷氏桿菌症不活化菌苗(第1、2和6血清型) 使用說明書

生物製劑(液體)

動物藥製字第 08857 號

本菌苗係以第1、2與6血清型水禽雷氏桿菌經培養所得菌液，以福馬林不活化處理，添加鋁膠為佐劑調製而成之黃白色懸濁液。

主要成分：每劑量(0.3mL)含有第1、2與6血清型水禽雷氏桿菌不活化前各 8×10^9 CFU 以上。

效 能：預防第1、2與6血清型水禽雷氏桿菌症，對於本病其他血清型感染缺乏交叉保護效果。

用法用量：充分震盪均勻後，基礎免疫肌肉注射1週齡北京鴨、番鴨或白羅曼鵝1劑量，2週齡時補強注射1次。

免疫反應：健康鴨(鵝)除接種當日出現輕微跛腳外，不會產生不良反應。

注意事項：1、僅供健康鴨(鵝)接種。

2、請使用滅菌或經15分鐘以上煮沸處理過注射器具。

3、菌苗使用前請先震盪混勻，連續注射時亦隨時搖動菌苗保持均勻狀態。

4、請依產品說明規定劑量使用，不可隨意降低劑量，以免影響抗體力價產生。

5、已開封菌苗請於24小時內使用完畢。

6、本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。

儲存方法：保存於2~8℃冰箱內，直到使用前才可取出，不可置於室溫、日光照射處或冷凍庫中。

保存期限：2年

包 裝：1,650劑量/500mL/瓶



行政院農業委員會家畜衛生試驗所
新北市淡水區中正路376號 電話:(02)-2621-2111